

GTT, Diabetes Mellitus

Afdeling Interne Geneeskunde
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Diagnostiek Diabetes Mellitus, buiten, tijdens of na de zwangerschap.
- * Patiënt is nuchter vanaf 24.00 uur en is in relatieve rust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen 30 minuten wachten tot bloedafname 0 min.
- * **2 flesjes Glucose, 375mg/ml, op laten drinken op tijdstip 0 in maximaal 5 minuten.**
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		-30 min	0	120 min
		Infuus prikken		
X	Glucose		X	X
	Verricht		Ja/nee	Ja/Nee
	Medicatie		75 gr glucose	
	Paraaf			

- * Duur van de test: 3 uur.

Diabetes gravidarum (WHO)	
Nuchter	en/of na 2 uur
≥ 7.0 mmol/l	≥ 7.8 mmol/l
Diabetes Mellitus(WHO/ADA)	
≥ 7.0 mmol/l	≥ 11,1 mmol/l

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: