

## Longoncologie behandeling SCLC Carboplatine-Etoposide

1<sup>e</sup> lijn bij SCLC, LD en ED (bij contra-indicatie voor Cisplatin), 4 kuren à 3 weken  
 Bij LD met concurrent radiotherapie vanaf de tweede kuur

Afspraakcode dagcentrum: gemetastaseerd: niet gemetastaseerd:  
 CARETOPME1 (dag 1) 2:45 uur CARETOPNG1 (dag 1) 2:45 uur  
 CARETOPME2 (dag 2 en 3) 1:45 uur CARETOPNG2 (dag 2 en 3) 1:45 uur

Kuur/cyclus:

|                 |  |                           |   |
|-----------------|--|---------------------------|---|
| Patiëntsticker: | Datum aanvraag   | Afdelingscode             | Afspraakcode DC zie hierboven               |
|                 | Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% |                           |   |
|                 | Kreatinineklaring  | ..... ml/min              |   |
|                 | Lengte (cm)  | Gewicht (kg)              | Lich.opp (m <sup>2</sup> )                  |
|                 | Toedieningswijze   | IV, tenzij anders vermeld |   |
|                 |  | 339966A<br>339966B        | chemo niet gemetastaseerd<br>chemo gemetast |
|                 | Naam + paraaf arts   |                           |   |
|                 | Gefaxt/gescand   | Paraaf:                   |   |

| datum | dag | Inlooptijd (hr:min) | geneesmiddel                                   | dosering              | dosis | pompstand | toelichting | Par.1    | Par.2 |  |
|-------|-----|---------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-------------|----------|-------|--|
|       | 1   |                     | Granisetron                                    |                       | 1 mg  |           | bolus       |          |       |  |
|       |     |                     | Dexamethason                                   |                       | 8 mg  |           | bolus       |          |       |  |
|       |     | 00:30               | <b>CARBOPLATINE</b><br>in 100 ml gluc 5 %      | AUC 6                 |       | mg        |             | in folie |       |  |
|       |     | 01:00               | <b>ETOPOSIDE</b><br>in 500 - 1000 ml NaCl 0,9% | 100 mg/m <sup>2</sup> |       | mg        |             | a.       |       |  |

|  |   |       |  |                       |      |    |       |    |  |
|--|---|-------|--|-----------------------|------|----|-------|----|--|
|  | 2 |       | Dexamethason                                   |                       | 8 mg |    | bolus |    |  |
|  |   | 01:00 | <b>ETOPOSIDE</b><br>in 500 - 1000 ml NaCl 0,9% | 100 mg/m <sup>2</sup> |      | mg |       | a. |  |

|  |   |       |  |                       |      |    |       |    |  |
|--|---|-------|--|-----------------------|------|----|-------|----|--|
|  | 3 |       | Dexamethason                                   |                       | 8 mg |    | bolus |    |  |
|  |   | 01:00 | <b>ETOPOSIDE</b><br>in 500 - 1000 ml NaCl 0,9% | 100 mg/m <sup>2</sup> |      | mg |       | a. |  |

### Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.

### Anti-emetica thuisadvies:

- dag 4 en 5 om 08:00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie SCLC Carboplatine - Etoposide

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: 1<sup>e</sup> lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED) met contra-indicatie voor Cisplatin.
- Bij LD met gelijktijdige radiotherapie vanaf de tweede kuur.
- Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

### Informatie over het geneesmiddel:

- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
  - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
  - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
- Etoposide: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer
  - Etoposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: longoncologie – voorlichting – carboplatine/etoposide

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax