

Longoncologie behandeling SCLC Carboplatine-Paclitaxel

2^e lijns behandeling bij SCLC, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CARBOPACLI 5 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetastaseerd
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

NB: voor verpleegafdeling bij paclitaxel-toediening:

- P/RR controle à 15 minuten tijdens het 1^e uur van toediening. Patiënt observeren op allergische reacties
- Standby medicatie: 1 mg Adrenaline, 25 mg Prednisolon, 2 mg Tavegil

datum	inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		Granisetron		1 mg		bolus		
		Clemastine		2 mg		bolus		
		Dexamethason		8 mg		bolus		
		Ranitidine		50 mg		bolus		
	00:30	inwerken pre-medicatie						
	03:00	PACLITAXEL in 250 ml NaCl 0,9%	175 mg/m ²	mg		in folie filter 0,2 µm		
	00:30	CARBOPLATINE in 100 ml gluc 5 %	AUC 6	mg		in folie		

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Observeer tijdens toediening Paclitaxel op overgevoelighedsreacties.
- Check of patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Achtergrondinformatie SCLC Carboplatine, Paclitaxel

Informatie over de kuur:

- Indicatie: 2e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over de geneesmiddelen:

- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
 - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
 - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
- Paclitaxel: Cytostaticum behorende tot de taxanen.
 - Allergische reacties worden waarschijnlijk veroorzaakt door Cremophor EL® (oplosmiddel) in de formulering.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: longoncologie – voorlichting – carboplatin/paclitaxel

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax