

# Longoncologie behandeling SCLC Cyclofosfamide-Doxorubicine-Etoposide (CDE)

2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> lijns behandeling SCLC, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CDE1 (dag 1) 2,5 uur. CDE2/3 (dag 2 en 3) 1,5 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Granisetron		1 mg		bolus		
			Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:15	<b>DOXORUBICINE</b> in 50 - 100 ml NaCl 0,9%	35 mg/m <sup>2</sup>	mg		in max 15 minuten in folie		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 500 - 1000 ml NaCl 0,9%	100 mg/m <sup>2</sup>	mg		a.		
		00:30	<b>CYCLOFOSFAMIDE</b> in 100 ml NaCl 0,9%	1000 mg/m <sup>2</sup>	mg				

	2		Dexamethason		8 mg		bolus		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 500 - 1000 ml NaCl 0,9%	100 mg/m <sup>2</sup>	mg		a.		

	2		Dexamethason		8 mg		bolus		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 500 - 1000 ml NaCl 0,9%	100 mg/m <sup>2</sup>	mg		a.		

## Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Kies voor een infusiesnelheid afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.

## anti-emetica thuisadvies:

- dag 4 en 5 om 08.00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zonodig medicatie metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie SCLC Cyclofosfamide-Doxorubicine-Etoposide (CDE)

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: 2e/3e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Doxorubicine: Cytostaticum behorende tot de antibiotica.
- Etoposide: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer
  - Etoposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan.
- Cyclofosfamide: Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
  - Grapefruit en pompelmoes bevatten een verbinding die de werking van cyclofosfamide kan verminderen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: longoncologie – voorlichting – Cyclofosfamide-Doxorubicine-Etoposide (CDE)

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Doxorubicine:
  - Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine.
  - Adviseer de patiënt de 1<sup>e</sup> 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.
- Cyclofosfamide:
  - Adviseer de patiënt extra te drinken en urine snel uit te plassen.
  - Instrueer de patiënt geen grapefruit en pompelmoes te eten en geen grapefruitsap en pompelmoessap te drinken.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax