

Longoncologie behandeling SCLC Topotecan

2^e lijns behandeling bij SCLC, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: TOPOTECAN: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9%	1.5 mg/m ²	mg				

	2		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9%	1.5 mg/m ²	mg				

	3		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							a. 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9%	1.5 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies en vervolg van de kuur: zie pagina 2

patiëntensticker

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	4		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							<i>a.</i> 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9%	1.5 mg/m ²	mg				

	5		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
							<i>a.</i> 100ml extra spoelen met NaCl 0.9%		
		00:30	TOPOTECAN in 50/100 ml NaCl 0,9%	1.5 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- a.* Topotecan is onverenigbaar met Dexamethason.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig dexamethason 8 mg
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

patiëntensticker

Achtergrondinformatie SCLC Topotecan

Informatie over de kuur:

- Indicatie: 2e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over het geneesmiddel:

- Topotecan: Cytostaticum, Topoisomerase-1-remmer

Voor meer informatie zie: DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - Topotecan

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax