

Longoncologie behandeling SCLC Teniposide

2^e lijns bij SCLC, met name bij hersenmetastasen. 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: TENIPOSIDE: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1						RR, pols, temp		
			Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	TENIPOSIDE in 500 ml NaCl 0,9%	120 mg/m ²	mg		in folie		
							RR, pols		

	2						RR, pols, temp		
			Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	TENIPOSIDE in 500 ml NaCl 0,9%	120 mg/m ²	mg		in folie		
							RR, pols		

	3						RR, pols, temp		
			Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	TENIPOSIDE in 500 ml NaCl 0,9%	120 mg/m ²	mg		in folie		
							RR, pols		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Bij infusie via CVC: spoel infuus systeem vooraf met 50 ml infusie vloeistof.

anti-emetica thuisadvies:

- dag 4 en 5 om 08:00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie SCLC Teniposide

Informatie over de kuur:

- Indicatie: 2e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom. Met name bij hersenmetastasen.
- Evaluatie: na 2 en na 4 weken

Informatie over het geneesmiddel:

- Teniposide: cytostaticum behorende tot de topoisomerase 2-remmers
 - Heparine kan neerslaan van teniposide veroorzaken.
 - Teniposide is zeer slecht oplosbaar in water, het oplosmiddel bestaat daarom uit Cremophor EL, dimethylacetamide en ethanol. De oppervlakte actieve stoffen vertonen na verdunning een geringe opalescentie. De oplossingen moeten echter wel helder zijn.
 - Teniposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: longoncologie – voorlichting - Teniposide

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax
- Bij hersenmetastasen wordt vaak Fenytoïne gegeven. In combinatie met Teniposide versnelt dit het metabolisme. Teniposide kan de bloedspiegels van Fenytoïne verlagen, waardoor het effect van Fenytoïne minder wordt en dus de kans op aanvallen toeneemt.