

Longoncologie behandeling NSCLC Bevacizumab maintenance

bij stadium IV NSCLC. Na 4 kuren carboplatine-paclitaxel-bevacizumab. Maintenance behandeling à 3 weken tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: BEVACIZU3> 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	01:30	BEVACIZUMAB in 100 ml NaCl 0,9%	15 mg/kg	mg		a.		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Indien goed getolereerd:
 - 1^e infuus: inlooptijd 01:30
 - 2^e infuus: inlooptijd 01:00
 - ≥ 3^e infuus: inlooptijd 00:30
- Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen.

Achtergrondinformatie NSCLC Bevacizumab maintenance

Informatie over de kuur:

- Indicatie: bij stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom. Na 4 kuren carboplatine-paclitaxel-bevacizumab.
- Maintenance behandeling à 3 weken
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over de geneesmiddelen:

- Bevacizumab: Recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Bevacizumab bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de belangrijkste factor voor vasculogenese en angiogenese, en remt daardoor de binding van VEGF aan zijn receptoren.
 - Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting -

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax