

Longoncologie behandeling NSCLC Carboplatine-Paclitaxel-Bevacizumab

bij stadium IV NSCLC. 4 kuren à 3 weken, gevolgd door Bevacizumab maintenance

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: PACLCARBE1 (kuur 1): 7 uur PACLCARBE2 (kuur 2): 6,5 uur PACLCARBE3 (kuur 3 en 4) 6 u
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966E	chemo - immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		Granisetron		1 mg		bolus		
		Dexamethason		8 mg		bolus		
		Clemastine		2 mg		bolus		
		Ranitidine		50 mg		bolus		
	00:30	inwerken pré-medicatie						
	03:00	PACLITAXEL in 250 ml NaCl 0,9%	200 mg/m ²	mg		filter 0,2 µm in folie		
	00:30	CARBOPLATINE in 100 ml gluc 5 %	AUC 6	mg		in folie		
		NaCl 0,9%		50 ml		extra spoelen <i>b.</i>		
	01:30	BEVACIZUMAB in 100 ml NaCl 0,9%	15 mg/kg	mg		<i>a.</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- Observeer op overgevoeligheidsreacties.
- *a.* Indien goed getolereerd:
 - 1^e infuus: inlooptijd 01:30
 - 2^e infuus: inlooptijd 01:00
 - ≥ 3^e infuus: inlooptijd 00:30
- *b.* Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (=kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Achtergrondinformatie NSCLC Carboplatine-Paclitaxel-Bevacizumab

Informatie over de kuur:

- Indicatie: bij stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom. 4 kuren à 3 weken, gevolgd door Bevacizumab maintenance.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over de geneesmiddelen:

- Paclitaxel: Cytostaticum behorende tot de taxanen.
 - Allergische reacties worden waarschijnlijk veroorzaakt door Cremophor EL® (oplosmiddel) in de formulering.
- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
 - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
 - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
- Bevacizumab: Recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Bevacizumab bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de belangrijkste factor voor vasculogenese en angiogenese, en remt daardoor de binding van VEGF aan zijn receptoren.
 - Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting -

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax