

## Longoncologie behandeling NSCLC Carboplatine-Gemcitabine

1<sup>e</sup> lijns behandeling bij stadium IV NSCLC, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CARBOGEM1: 2 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetastaseerd
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
		00:30	<b>GEMCITABINE</b> in 250 ml NaCl 0,9%	1125 mg/m <sup>2</sup>		mg		a.	
		00:30	<b>CARBOPLATINE</b> in 100 ml gluc 5 %	AUC 6		mg		in folie	

### Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.
- Check of de patiënt een afspraak heeft voor dag 8 gemcitabine.

### anti-emetica thuisadvies:

- Dexamethason: dag 2 en 3 om 08:00 uur 8 mg p.o.
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

## Achtergrondinformatie NSCLC Carboplatine-Gemcitabine

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: 1<sup>e</sup> lijns behandeling bij stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom
- gevolgd door Gemcitabine op dag 8
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
  - Gemcitabine heeft radiosensibiliserende activiteit.
- Carboplatin: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
  - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
  - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – carboplatine-gemcitabine

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen Gemcitabine.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax