

## Longoncologie behandeling NSCLC Docetaxel monotherapie

2<sup>e</sup> lijns behandeling bij NSCLC, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: DOCEMETA: 2 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		Dexamethason		8 mg		bolus		
	00:30	inwerken pré-medicatie						
	01:00	<b>DOCETAXEL</b> in 250 ml NaCl 0,9%	75 mg/m <sup>2</sup>	mg				

### Verpleegkundige toedien-instructies

- Observeer op overgevoelighedsreacties.
- Check of patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.

### anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie NSCLC Docetaxel monotherapie

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, 2e lijns behandeling
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over het geneesmiddel:

- Docetaxel: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de taxanen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - docetaxel

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Geef de patiënt advies over gebruik van nagelbescherming. Om nagel afwijkingen of verlies te voorkomen kan er een nagelverharder geadviseerd worden om te gebruiken. Men dient deze zelf te kopen bij de drogist. Nagelverharder voor **gevoelige** nagels. Bijvoorbeeld Soft van Herôme. Dit is zonder formalhyde en geeft geen pijn. Gebruiken vanaf het aller eerste begin, zo mogelijk de avond voor de kuur behandeling. Ook de voetenagels. Ook mannen adviseren.
- Instrueer de patiënt neuropathische klachten te melden aan de behandelend arts.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax