

**Longoncologie behandeling NSCLC Cisplatine of Carboplatine-Gemcitabine,
dag 8 Gemcitabine**

1e lijns behandeling bij stadium IV NSCLC, 1x per 3 weken, 4 kuren

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: GEMCIMETA: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	1125 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC Cisplatin of Carboplatine- Gemcitabine, Gemcitabine dag 8

Informatie over de kuur:

- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, 1e lijns behandeling bij stadium IV.
- Cisplatin-Gemcitabine: Cisplatin en Gemcitabine klinisch, daarna Gemcitabine op dag 8 op het Dagcentrum.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
- Cisplatin: Cytostaticum behorende tot de platina verbindingen.
- Carboplatin: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
 - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
 - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatin/gemcitabine
- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – carboplatine-gemcitabine

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax