

Longoncologie behandeling NSCLC Cetuximab met of zonder afatinib

vervolglijn bij stadium IV NSCLC, à 2 weken maintenance tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CETUX-2WK: 4 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Indien Afatinib voorgeschreven: 1 x dd p.o., eigen beheer.

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						a. RR, pols, temp		
		Dexamethason		8 mg		bolus		
		Clemastine		2 mg		bolus		
	02:00	CETUXIMAB 5 mg/ml in NaCl 0,9%	500 mg/m ²	mg		a.		
	01:00	OBSERVATIE				a.		

Verpleegkundige toedien-instructies:

- a. Controles pré-, mid-, post Cetuximab en na 1 uur observatie.
- Observeer op overgevoelighedsreacties.

Achtergrondinformatie NSCLC Cetuximab met of zonder afatinib

Informatie over de kuur:

- Indicatie: niet-kleincellig longcarcinoom; vervolglijn bij stadium IV

Informatie over het geneesmiddel:

- Cetuximab: Monoklonaal antilichaam tegen EGFR (epidermal growth factor receptor)
- Afatinib (Giotrif): antineoplastische proteïnekinaseremmer, blokkeert EGFR (epidermal growth factor receptor)
 - Bijwerkingen: diarree, huidaandoeningen, stomatitis en paronychia.

Voor meer informatie over Cetuximab zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - cetuximab

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Instrueer de patiënt onmiddellijk contact op te nemen met zijn behandelend arts in het geval van late infusie-reacties.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax