

Longoncologie behandeling NSCLC Gemcitabine monotherapie

Vervolg-lijn, 4 kuren à 4 weken

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: GEMCIMETA: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	1250 mg/m ²	mg				

	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	1250 mg/m ²	mg				

	15		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	1250 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC Gemcitabine monotherapie

Informatie over de kuur:

- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, vervolglijn
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
 - Gemcitabine heeft radiosensibiliserende activiteit.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – gemcitabine mono

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax