

# Longoncologie behandeling NSCLC Epirubicine-Gemcitabine

Vervolglijn stadium IV, 4 kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: EPI/GEMCI1 (dag 1) : 1,5 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2	
	1		Granisetron		1 mg		bolus			
			Dexamethason		8 mg		bolus			
		00:15	<b>EPIRUBICINE</b> in 50 ml NaCl 0,9%	100 mg/m <sup>2</sup>		mg		a. in max. 15 min. in folie		
		00:30	<b>GEMCITABINE</b> in 250 ml NaCl 0,9%	1125 mg/m <sup>2</sup>		mg				

## Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik niet steeds in dezelfde vene.
- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.
- Bij infusie via CVC: spoel infuuslijn vooraf met 50 ml infusievloeistof.
- a. Kies voor een infusiesnelheid afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.
- Check bij ontslag afspraak voor dag 8 op het dagcentrum (Gemcitabine).

## anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason: dag 2 en 3 om 08:00 8 mg p.o.  
zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie NSCLC Epirubicine-Gemcitabine

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: palliatief, vervolgvrij bij niet-kleincellig longcarcinoom stadium IV
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Epirubicine: Cytostatisch antibioticum behorende tot de anthracyclinederivaten.
  - Epirubicine vormt een neerslag met heparine.
- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
  - Gemcitabine heeft radiosensibiliserende activiteit.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Docportal: Longoncologie – voorlichting – epirubicine/gemcitabine

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Epirubicine:
  - Stel de patiënt gerust wat betreft mogelijk roodgekleurde urine.
  - Adviseer de patiënt de 1<sup>e</sup> 48 uur na infusie geen contactlenzen te dragen.
- Gemcitabine:
  - Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax