

In studieverband :.....
 Buiten studieverband

HOVON 97 arm B AZACITIDINE MAINTENANCE

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 01255	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: AML of myelodysplasie Cyclusduur: 4 weken Totaal: maximaal 12 Bron:	Afspraakcodes DC: AZAHOVON97 0:30 min	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

Kuurnummer:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1 t/m 7	ONDANSETRON	p.o.	8 mg	recept arts thuis innemen, check recept		
	1	AZACITIDINE 50 mg/m ² let op: studieaanvraag nodig	sc	... mg	<i>a,b,c,d, e MUST</i>		
	2	AZACITIDINE 50 mg/m ² let op: studieaanvraag nodig	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	3	AZACITIDINE 50 mg/m ² let op: studieaanvraag nodig	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	4	AZACITIDINE 50 mg/m ² let op: studieaanvraag nodig	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		
	5	AZACITIDINE 50 mg/m ² let op: studieaanvraag nodig	sc	... mg	<i>a,b,c,d</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies zie volgende pagina.

Verpleegkundige toedien-instructies

- **De Azacitidine wordt bij bellen bereid (in tegenstelling tot Azacitidine buiten studieverband). Bel daarvoor de apotheek cytostatica (14068), nadat de patiënt zich heeft gemeld.**
- **b. Azacitidine is ongekoued na bereiding 45 min. houdbaar.**
- c. Rol vóór toediening de spuit krachtig tussen handen heen en weer om homogene suspensie te verkrijgen, de oplossing heeft neiging tot neerzakken.
- d. Noteer injectieplaats in het zorgdossier.
- e. Screen dag 1 op ondervoeding: neem de MUST af.
- Gereconstitueerd Azacitidine moet diep-subcutaan in de bovenarm, het dijbeen of de buik worden geïnjecteerd met behulp van een naald van 25 gauge (Een oranje naald voor subcutane toediening).
- Om te voorkomen dat de injectie in de spierlaag terecht komt, dient de naald ingebracht te worden onder een hoek van 45 tot 90 graden afhankelijk van de hoeveelheid vetweefsel en de elasticiteit van de huid.
- Om huidirritatie te voorkomen, dient er geen medicijn in de naald aanwezig te zijn. Verwijder de lucht in de naald niet voorafgaand aan de injectie.
- Doses groter dan 4 ml moeten op twee afzonderlijke plaatsen worden geïnjecteerd.
- De suspensie langzaam injecteren.
- De naald na het inspuiten van de Vidaza pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- De injectieplaatsen moeten worden afgewisseld. Nieuwe injecties moeten op een afstand van ten minste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont.
- Indien de patiënt pijn heeft tijdens het geven van de injectie kan 15 minuten voor de injectie niet-steroïdale gel (NSAID) op de injectieplaats worden aangebracht. De arts of verpleegkundige specialist een recept laten schrijven. Voltarengel is een drogisterij-artikel en moet de patiënt zelf kopen. Hier is geen recept voor nodig. Emla is ook een optie, overleg even met de arts/N.P.
- Gevoelige en rode injectieplaatsen kunnen driemaal daags worden behandeld met NSAID gel.
- Indien de injectieplaats jeukt, kan een antihistaminecrème worden toegepast of een milde corticosteroiden crème.
- Azacitidine mag niet thuis worden toegediend!

Achtergrondinformatie HOVON 97: Azacitidine maintenance

Informatie over de studie:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Behandeling van acute myeloïde leukemie (AML), myelodysplastisch syndroom (MDS).
- Indicatie: Hovon 97: een prospectieve, multicenter, gerandomiseerde fase III studie. Een gerandomiseerde onderhoudsbehandeling met Azacitidine bij oudere patiënten ([≥] 60 jaar) met acute myeloïde leukemie- of Myelodysplasie (Type RAEB en RAEBT) met minder dan 5% beenmerg blasten na 2 chemokuren; een studie naar het effect van onderhoudsbehandeling met Azacitidine.
- Azacitidine moet starten binnen drie maanden na de start van de laatste inductiecyclus.
- Evaluatie: elke 4 weken policonrole.

Informatie over het geneesmiddel:

- Azacitidine: antineoplastica, pyrimidine-analogen met een hypomethylerende werking, d.w.z. dat celdelingremmende genen worden gestimuleerd. Het middel is cytotoxisch.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Check of Ondansetron is ingenomen. Zo niet, een tablet geven en patiënt instrueren.

Contact

- Onderzoeksarts: Prof. dr. E. Vellenga

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Ondansetron 8 mg per os, op de ochtend voor de injectie.