

In studieverband :.....   
 Buiten studieverband

## GEMCITABINE

### Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: Hodgkin Cyclusduur: 4 weken Totaal: 6 Bron:	Afspraakcodes DC: GEMCIMETA 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

**Kuurnummer:** .....

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1, 2		DEXAMETHASON	p.o.	8 mg/m <sup>2</sup>		recept arts		
	1	00:30	<b>GEMCITABINE</b> 1250 mg/m <sup>2</sup> in 250 ml NaCl 0.9%	iv	... mg		<i>a.</i>		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Prik het infuus niet in een kleine vene.
- Bij pijn op injectieplaats: Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken.
- Verlenging van de infuusduur verhoogt de toxiciteit.
- Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

**Kuurdag 8 en 15 op de volgende pagina**

patiëntensticker

Kuurnummer: .....

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	8, 9		DEXAMETHASON	p.o.	8 mg/m <sup>2</sup>		recept arts		
	8	00:30	<b>GEMCITABINE</b> 1250 mg/m <sup>2</sup> in 250 ml NaCl 0.9%	iv	... mg		<i>a.</i>		

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	15, 16		DEXAMETHASON	p.o.	8 mg/m <sup>2</sup>		recept arts		
	15	00:30	<b>GEMCITABINE</b> 1250 mg/m <sup>2</sup> in 250 ml NaCl 0.9%	iv	... mg		<i>a.</i>		

#### Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Prik het infuus niet in een kleine vene.
- Bij pijn op injectieplaats: Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken.
- Verlenging van de infuusduur verhoogt de toxiciteit.

patiëntensticker

## Achtergrondinformatie Gemcitabine

### Informatie over de kuur

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Hodgkin lymfoom
- Indicatie: Palliatief bij M. Hodgkin
- Evaluatie: na 2 kuren, daarna eventueel continueren

### Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

### Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Gemcitabine:  
kan lichte tot matige slaperigheid, aangeschoten gedrag, verminderde alertheid veroorzaken. Waarschuw de patiënt dat hij slechts deelneemt aan het verkeer of machines gebruikt indien is gebleken dat deze bijwerking bij hem niet optreedt. Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen. Zie ook SOP.

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Ondansetron, dag 1 's ochtends 1 x 8 mg/p.o. of i.v. voor infuus. 's Avonds 8 mg/p.o.  
dag 2: 's ochtends 8 mg/p.o./z.n.  
evt. 2 x dd 8 mg/p.o. zolang als nodig is: max. 3 dagen