

Moederprotocol IHEM NHLB R-CHOP21



Naam Behandelplan:	IHEM NHLB R-CHOP21	
Synoniemen:	Doxorubicine, Vincristine, Cyclofosfamide, Rituximab	
Indicatie:	Lymfatische (B-cel) - maligniteiten	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	3-8	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 420 min 2 ^e kuur (snelle): 240 min	
Facturerings indicatie:	1430, 160, 469	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli											
				Dag	1	2	3	4	5					21	
Chemotherapie															
DOXORUBICINE (in folie) In 50 – 100 ml NaCl 0,9%	50 mg/m ²	IV	00:15	X											
VINCRIStINE In 50 ml NaCl 0,9%	1,4 mg/m ² max. 2 mg	IV	00:15	X											
CYCLOFOSFAMIDE In 100 ml NaCl 0,9%	750 mg/m ²	IV	00:30	X											
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m ²	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X											
PREDNISOLON	100mg	PO	Ochtend	X	X	X	X	X							
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie															
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2xdd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X	?									
Movicolon (bij obstipatie)	1 sachet zo nodig 3xdd	PO													
Allopurinol (bij hoge tumorload)	300mg	PO	1xdd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pegfilgrastim	6mg	SC	Eenmalig (indien nodig)		X										
Pre- medicatie/ anti-emetica															
ONDANSETRON	8mg	IV	Bolus	X											
PREDNISOLON	25mg	IV	Bolus	X											
CLEMAStINE	2mg	IV	Bolus	X											
PARACETAMOL	1000mg	PO		X											



Moederprotocol IHEM NHLB R-CHOP21

Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen:
 - Roodgekleurde urine (Doxirubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
 - Prednisolon kan daling in glucosespiegel geven (bij 1^e kuur controle bij de huisarts 2 uur na de lunch).
 - Eet geen pompoelmoes of grapefruit vanwege interactie (Cyclofosfamide).
- Haaruitval
- Verwachte misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Excreta: 6 dagen
- Polyneuropathy (zenuwpijn): Vincristine. Neuropathische klachten melden aan de arts.



Afspraakaanvragen											
Cyclus/dag	C0D1	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	C8D8	C8D26
Arts	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verpleegkundig specialist	X								X		
Dagcentrum afspraak		X							X		

Lab									
Cyclus/dag	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C7D1	C8D1	
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INR									
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASAT									
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X								
OncoLifeS EDTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X								
OncoLifeS serum (stolbuis) opslag standaard	X								
OncoLifeS Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X				X				



Beeldvorming/overig		
Cyclus/ dag	C3D16	C8D16
PET	X	X
CT	X	

Zorgverlener communicatieorders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid bij neurotoxiciteit	Dosering Vincristine aanpassen bij neurotoxiciteit.
Beleid starten volgende cyclus/kuur	<ul style="list-style-type: none"> Bij eerdere overgevoelighedsreacties en/of lymfoomcellen $> 5 \times 10^9/l$: steeds langzame schema voorschrijven. Indien voor het begin van de volgende kuur leukocyten $< 4 \times 10^9/l$ en/ of trombocyten $< 100 \times 10^9/l$ zijn, dan 1 week uitstellen. Indien na 1 week uitstel onvoldoende herstel: dosis aanpassen volgens onderstaand schema.

Leuko $\times 10^9/l$	Trombox $10^9/l$	C	H	O	P	R
> 3	> 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.0 – 3.0	> 100	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
1.0 – 2.0	50 - 100	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %
< 1	< 50	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoelighedsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab

Vitale gegevens						
Tijd tov medicatie start/stop	RR	Pols	SpO2	AF	temp	gewicht
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X			X	

Toegangsweg
Perifeer

Spedmedicatie Ja
