

## **Glucagontest**

### **Doel van de test:**

Glucagon is een hormoon, dat een soort tegenspeler is van insuline. Door toediening van Glucagon stijgt de bloedsuikerspiegel. Als reactie hierop wordt de alvleesklier gestimuleerd tot afgifte van insuline, dat de bloedsuikerspiegel laat dalen. Deze test meet in welke mate de alvleesklier in staat is om insuline te produceren.

### **Uitvoering van de test:**

- U mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken.
- U kunt aan uw arts vragen, of u op de ochtend van de test uw medicijnen mag innemen.
- 's Ochtends wordt u op het dagcentrum verwacht, waar de test plaatsvindt.
- U krijgt een infuus, waarna een half uur wordt gewacht om u tot rust te laten komen.
- Tijdens de test zit u in een stoel.
- Er wordt bloed bij u afgenomen via het infuus om de uitgangssituatie vast te leggen.
- Hierna wordt er Glucagon via het infuus toegediend.
- Vervolgens wordt er na 5, 10, 15 en 30 minuten weer bloed afgenomen via het infuus.
- Na afloop van de test wordt het infuus verwijderd en krijgt u een maaltijd aangeboden.
- De test duurt ongeveer 1 uur.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw internist (via 050-3614697) of met het Dagcentrum: 050-3613402.