

## **GTT ( Glucosetolerantietest)**

### **Doel van de test:**

Onderzoek naar de afgifte van groeihormoon door de hypofyse. Na het gebruik van suikerwater hoort de groeihormoonspiegel te dalen, behalve als er sprake is van acromegalie.

Een andere reden om de test uit te voeren is om te kijken naar de bloedsuikerspiegel. Deze is na toediening van Glucose(= suikerwater) verhoogd bij suikerziekte.

### **Uitvoering van de test:**

- U mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken.
- U kunt aan uw arts vragen, of u op de ochtend van de test uw medicijnen mag innemen.
- 's Ochtends wordt u op het dagcentrum verwacht, waar de test plaatsvindt.
- U krijgt een infuus, waarna een half uur wordt gewacht om u tot rust te laten komen.
- Tijdens de test zit u in een stoel.
- Er wordt bloed bij u afgenomen via het infuus om de uitgangssituatie vast te leggen.
- Na 15 minuten krijgt u suikerwater te drinken.
- Vervolgens wordt nog een aantal keren met tussenpozen bloed afgenomen via het infuus.
- Na afloop van de test wordt het infuus verwijderd en krijgt u een maaltijd aangeboden.
- De test duurt ongeveer 3,5 uur.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw internist (via 050-3614697) of met het Dagcentrum: 050-3613402.