

Octreotidetest

Doel van de test:

Bij acromegalie is er sprake van overproductie van het groeihormoon. Deze overproductie kan worden geremd door stoffen als Octreotide en Lanreotide. Tijdens deze test wordt een proefdosis Octreotide toegediend, waarna de Groeihormoonspiegels worden gemeten. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt bekeken of een eventuele onderhoudsbehandeling met Octreotide of Lanreotide succes zal hebben.

Uitvoering van de test:

- U mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken.
- U kunt aan uw arts vragen, of u op de ochtend van de test uw medicijnen mag innemen.
- 's Ochtends wordt u op het dagcentrum verwacht, waar de test plaatsvindt.
- U krijgt een infuus, waarna een half uur wordt gewacht om u tot rust te laten komen.
- Tijdens de test zit u in een stoel.
- Er wordt bloed bij u afgenomen via het infuus om de uitgangssituatie vast te leggen.
- Na 15 minuten wordt Octreotide via het infuus toegediend. Soms kunt u zich kortdurend wat misselijk voelen, maar dit trekt snel weer weg.
- Vervolgens wordt er nog een aantal keren met tussenpozen bloed afgenomen via het infuus.
- Na afloop van de test wordt het infuus verwijderd en krijgt u een maaltijd aangeboden.
- De test duurt ongeveer 3,5 uur.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw internist (via 050-3614697) of met het Dagcentrum: 050-3613402.