

Synacthentest

Doel van de test:

Onderzoek naar het functioneren van de bijnierschors. De hypofyse geeft ACTH af aan het bloed, waardoor er door de bijnierschors Cortisol wordt geproduceerd. Tijdens deze test wordt een vastgestelde hoeveelheid synthetisch ACTH (Synacthen®) toegediend, waarna in het bloed wordt gemeten hoeveel Cortisol er wordt geproduceerd.

Uitvoering van de test:

- U mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken.
- U kunt aan uw arts vragen, of u op de ochtend van de test uw medicijnen mag innemen.
- 's Ochtends wordt u op het dagcentrum verwacht, waar de test plaatsvindt.
- U krijgt een infuus, waarna een half uur wordt gewacht om u tot rust te laten komen.
- Tijdens de test zit u in een stoel.
- Er wordt bloed bij u afgenomen via het infuus om de uitgangssituatie vast te leggen.
- Daarna wordt Synacthen® via het infuus toegediend.
- Vervolgens wordt er nog een aantal keren met tussenpozen bloed afgenomen via het infuus.
- Na afloop van de test wordt het infuus verwijderd en krijgt u een maaltijd aangeboden.
- De test duurt ongeveer 2 uur.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw internist (via 050-3614697) of met het Dagcentrum: 050-3613402.