

CRH Test

Afdeling Interne Geneeskunde- UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Differentiaaldiagnostiek ACTH-afhankelijk syndroom v. Cushing.
Zelden: differentiaaldiagnostiek centraal hypocortisolisme.
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en is in rust tijdens de test.
- * Infuus NaCL 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15.
- * CRH Ferring 100 microgram(= 1 ampul) oplossen met bijgevoegde vloeistof vlak voor toediening .
Binnen 30 seconden i.v. toedienen via kraantje.
Bijwerkingen: oa kortdurend blozen,
zie ook DocPortal.
- * **EDTA buizen (ACTH) in ijs plaatsen en ook direct na afname terugplaatsen in ijs.**
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		- 45min	-15 min	0 min	15 min	30 min	60 min	120 min
		Infuus prikken						
X	ACTH		X	X	X	X	X	X
X	Cortisol		X	X	X	X	X	X
	Verricht		Ja/Nee		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			100 mcg CRH				
	Paraaf							

- * Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: