

* Doel van de test: Bij diabetes insipidus bepalen of dit een renale of centrale oorzaak heeft of dat het psychogene polydipsie betreft.

* Vanaf 24.00 uur alleen water drinken en na 8.00 uur niets per os. Soms blijft patient eerder nuchter, dit in opdracht arts. Licht ontbijt toegestaan; geen koffie, thee en roken.

* Patient heeft bedrust, halfzittende houding, mag naar toilet.

* **Bloedafname d.m.v. venapunctie, evt. verblijfsnaald. Bloed en urine cito opsturen, lab waarschuwen. Tel. 18040.**

* Volgens onderstaand schema bloed afnemen, laten plassen(**voor het wegen**), wegen en bloeddruk meten. Urinevolume meten en op labbriefje noteren. Alle bevindingen in schema noteren.

Dorstproef

Afdeling Interne Geneeskunde-UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon
Consulten 77060		Gewicht	97%:

	T=0	T=30	T=60	T=180	T=210	T=240	T=360	T=390	T=420	T=480	T=540	T=600	T=660**
Wegen	X					X	X		X	X	X		
Gewicht:kg				kgkg	kgkgkg		
Urine meten			X	X		X	X		X	X	X	X	X
Urinevolume		mlml	mlml	mlmlmlmlml
Urine labwaarts			X			X			X	X	X	X	X
Osmolaliteit urine.		 mOsmol/kg		 mOsmol/kg		 mOsmol/kg mOsmol/kg mOsmol/kg mOsmol/kg mOsmol/kg
Venapunctie		X			X			X		X	X		
Osmolaliteit plasma.	 mOsmol/kg		 mOsmol/kg		 mOsmol/kg	 mOsmol/kg mOsmol/kg		
Natrium plasma.	mmol/l		mmol/l		mmol/l	mmol/lmmol/l		
RR	.../....					.../....	.../....		.../....	.../....	.../....		
Minrin, 2 mcg,IM											

* **Aanvrager daags tevoren inlichten over test en bereikbaarheid afspreken t.b.v noodzakelijke supervisie.**

* **Als uitslagen van T=420 binnen zijn uiterlijk na 3 kwartier overleggen over voortzetten van**

test en evt. Minringift op T=480(I.M., evt. S.C.), ook als de uitslagen nog niet bekend zijn. Na Minrin gift is vrij drinken toegestaan.

**** Alleen indien Minrin om 17.00 uur is toegediend.**

Overleg over tussentijds stoppen bij:

Overleg minringift bij:

* Urine osmolaliteit > 800 mOsmol/kg.

* Urineproductie < 0,5 ml/min (30 ml/uur).

* Plasma osmolaliteit > 305 mOsmol/kg.

* Plasma Natrium > 150 mmol/l.

* Gewichtsafname > 3% van het uitgangsgewicht.

* Patient mag na de laatste bloedafnames naar huis.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO:

