

GHRH TEST

Afdeling Interne Geneeskunde-UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

* Doel van de test: Diagnostiek acromegalie en groeihormoondeficiëntie.

* GHRH Ferring(100 microgram= 2 ampullen) oplossen met bijgevoegde vloeistof, en binnen 30 seconden i.v. toedienen via het kraantje.

Bijwerkingen: oa warmtegevoel, tintelingen, misselijkheid, reuk- en smaakstoornissen.
Zie ook DocPortal.

* Patient is nuchter vanaf 24 uur en heeft bedrust tijdens de test.

* Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname
-15.

* Bloedafname volgens onderstaand schema.

		- 45 min	- 15 min	0 min	15 min	30 min	60 min	120 min
		Infuus prikken						
X	Groeihormoon		X	X	X	X	X	X
	Verricht		Ja/Nee		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			100 mcg GHRH				
	Paraaf							

* Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: