

Glucagon test

Afdeling interne geneeskunde- UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: onderzoek naar de aanmaak van insuline in reactie op een Glucagongift.
De hoeveelheid C-peptide in het bloed geeft een indicatie t.a.v. de resterende insulineproductie.
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en is in rust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15
- * 1 mg Glucagon oplossen met bijgevoegde vloeistof .
In 30 – 40 seconden i.v. toedienen via kraantje.
Bijwerkingen: zie DocPortal.
- * Bloedafname uit infuus volgens onderstaand schema.

		-45 min	-15 min	0 min	5 min	10 min	15 min	30 min
	Infuus prikken							
X	Glucose		X	X	X	X	X	X
X	C-peptide		X	X	X	X	X	X
	Verricht		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			1 mg Glucagon				
	Paraaf							

- * Duur van de test: 1,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: