

GTT (Acromegalie)

Afdeling Interne geneeskunde- UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek:	Verpleegkundige		
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Aantonen van autonome groeihormoonoverproductie.
Bij Acromegalie wordt door een glucosegift de groeihormoonproductie onvoldoende onderdrukt en soms zelfs gestimuleerd. Remcriterium < 3 mE/l (< 1 µg/l).
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en is in rust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9 % inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15.
- * **2 flesjes Glucose, 375mg/ml, op laten drinken op tijdstip 0 in maximaal 5 minuten.**
- * Bloedafnames volgens onderstaand schema.

		- 45 min	-15 min	0 min	30 min	60 min	90 min	120 min
		Infuus prikken						
X	Glucose		X	X	X	X	X	X
X	Groeihormoon		X	X	X	X	X	X
	Prolactine							
	α-subunits							
	Verricht		Ja/Nee		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			75 gr. Glucose				
	Paraaf							

- * Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: