

LHRH Test

Afdeling Interne geneeskunde- UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Differentiaaldiagnostiek van centraal hypogonadisme.
Evaluatie paradoxale groeihormoon respons bij acromegalie.
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en is in rust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15.
- * Gonadoreline, 0,1 MG/ML(= 1 ampul) binnen 30 seconden i.v. via kraantje toedienen.
Bijwerking: kortdurend warmtegevoel in hoofd, hals en bovenlichaam.
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		- 45 min	-15 min	0 min	15 min	30 min	60 min	120 min
		Infuus prikken						
X	LH		X	X	X	X	X	X
X	FSH		X	X	X	X	X	X
	Groeihormoon							
	Testosteron							
	Oestradiol							
	Verricht		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			100 mcg LHRH				
	Paraaf							

- * Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: