

Octreotide test

Afdeling Interne Geneeskunde-UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Middels een proefgift Octreotide wordt een indicatie verkregen van het te verwachten succes bij een onderhoudsbehandeling met Octreotide of Lanreotide bij acromegalie.
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en heeft bedrust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15.
- * 1 ampul Sandostatine(50 microgram Octreotide/ 1 ml) i.v. binnen 30 seconden via kraantje toedienen.
Bijwerkingen: direct na toediening misselijkheid en evt. flauwvallen. Zie ook DocPortal.
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		- 45 min	-15 min	0 min	15 min	30 min	60 min	90 min	120 min
	infuus prikken								
X	Groeihormoon		X	X	X	X	X	X	X
	Prolactine								
	α -subunits								
	Verricht		Ja/Nee		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			50 mcg Sandostatine					
	Paraaf								

- * Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: