

Synacthen test

Afdeling Interne Geneeskunde- UMCG

Endocrinologie

Datum onderzoek		verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	telefoon

- * Doel van de test: door toediening van een vastgestelde hoeveelheid synthetisch ACTH(= Synacthen) wordt de bijnierschors aangezet tot de productie van cortisol. Dit wordt in het bloed gemeten en vergeleken met normaalwaarden.
- * Patiënt is nuchter vanaf 24.00 uur en is in rust tijdens de test.
- * Bij voorkeur inplannen tussen 8 en 9 uur 's morgens.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot tijdstip 0.
- * Synacthen, 0,25 mg i.v. binnen 30 seconden via kraantje toedienen.
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		-30 min	0 min	30 min	60 min
		infuus prikken			
X	Cortisol		X	X	X
X	ACTH		X		
	Verricht		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie		0,25 mg Synacthen		
	Paraaf				

- * Duur van de test: 2 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: