

TRH test

Afdeling Interne Geneeskunde-UMCG
Endocrinologie

Datum onderzoek		Verpleegkundige	
Naam arts	Pieper	Afdeling	Telefoon

- * Doel van de test: Evaluatie paradoxale groeihormoon respons bij acromegalie
Differentiaaldiagnostiek van inappropriete TSH-secretie
- * Patient is nuchter vanaf 24.00 uur en heeft bedrust tijdens de test.
- * Infuus NaCl 0,9% inbrengen, 30 minuten wachten tot bloedafname -15.
- * TRH, 200 microgram (= 1 ampul), i.v. binnen 30 seconden via kraantje toedienen.
Bijwerkingen: Vreemde smaak in de mond, hartkloppingen, " opvlieger".
Dit verdwijnt weer snel.
- * Bloedafname volgens onderstaand schema.

		-45 min	-15 min	0 min	15 min	30 min	60 min	120 min
		infuus prikken						
X	FT4		X					
X	FT3		X					
X	TSH		X	X	X	X	X	X
	Groeihormoon							
	α -subunits							
	Prolactine							
	Verricht		Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
	Medicatie			200 mcg TRH				
	Paraaf							

- * Duur van de test: 3,5 uur.

Uitkomsten n.a.v. de risico-inventarisatie MRSA en BMRO: