

Protocol assisteren: Heparbiopsie (poliklinisch)

- * Biopt wordt altijd door een MDL arts (of i.o) gedaan

Doel

- * Het verkrijgen van weefsel uit de lever voor nader onderzoek
- * Het onderzoek is van belang om tot een juiste diagnose en/of behandeling te komen

Benodigde middelen en materialen (Alfabetische volgorde)

1x 10 cc spuit met lidocaïne 2% met zwarte of oranje naald	- Klaarleggen op kar
1x 10 cc spuit met Nacl 0,9%	- Klaarleggen op kar
1x Biopsienaald Menghiniset, 1.4 mm	- Op steriel veld
Echoapparaat	- Klaarzetten in hoek (bij aanrecht)
1x Evt. blauw mesje	- Op steriel veld
Flesje chloorhexidine	- Klaarzetten op kar
1x Folidrape (groen steriel doekje)	- Steriel veld van maken
1x Gazen, steriel 10 x 10cm	- Op steriel veld
1x Handschoenen steriel (maat vragen aan arts)	- Klaarleggen op aanrecht
1x Onderlegger (groen)	- Klaarleggen op aanrecht
1x Potje met rode dop (voor biopt)	- Klaarzetten op kar
1x Tegaderm wondpad	- Klaarleggen op kar
1x Viltstift	- Klaarleggen op kar
4x Wattenstokjes	- In flesje chloorhexidine

Vorbereiding

- * Verzamel alle benodigdheden in de biopsiekamer (zie boven)
- * Patiënt uit de wachtkamer halen en op een bed leggen
- * Controles doen volgens observatielijst (bijzonderheden doorgeven aan arts)
- * Informeer de patiënt over het onderzoek
- * Arts bellen die biopt gaat doen

Werkwijze

- * Patiënt gaat plat in bed liggen met de rechterarm boven het hoofd
- * Onderlegger wordt onder patiënt geschoven (bij plaats van biopt)
- * Biopteur bepaald de biopsieplaats door middel van een echo
- * Biopteur gaat desinfecteren
- * Lokaal anesthesie wordt gegeven
- * Er wordt een kleine incisie gemaakt
- * Biopt wordt genomen met Menghiniset (speciale spuit met naald)
- * Binnenste gedeelte van de naald wordt er uitgehaald
- * Naald wordt op de spuit Nacl.0,9% gedaan
- * Doorspuiten zodat biopt in het potje komt
- * Afplakken met tegaderm wondpad

Nazorg

- * Verder nazorg vindt plaats op het dagcentrum en bestaat uit:
 - RR + pols controle, eerste uur ieder kwartier, 2e uur elk half uur, daarna ieder uur
 - Totaal 4 uur (Zie observatie schema)
- * Biopt brengen naar PA lab

Administratie

- * Aanvraag door de arts in Epic latten zetten en uitprinten
- * PA sticker op het potje plakken
- * Formulier opsturen naar polikliniek MDL

Aandachtspunten

- * Patiënt kan iets last van schouder krijgen
- * Bij vragen en/of calamiteiten kan men altijd de biopteur raadplegen
- * Dag van en na biopt niet zwaar tillen en/of sporten

