

Toedienlijst Immuunglobulines (Nanogam, Kiovig, Privigen)

Interval	: afhankelijk van IgG waarden in het bloed, de infectie incidentie of de ziekte activiteit. (zie medische opdracht)
Totaal	: onbeperkt (zie medische opdracht)
Bruto behandeltime	: afhankelijk van de dosis en de toedieningssnelheid.
<i>Let op: gebruik een ander schema bij ITP</i>	

Infuus 1, Schema 1

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						Bloedafname, zie order in EPIC
						a. RR, pols, temp
00:30	Nanogam/ Kiovig/Privigen	0,2 – 0,8 g/kg		25	12	
00:30				50	25	
				100		b.

Infuus 2, Schema 2

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						bloedafname, zie order in EPIC
						a. RR, pols, temp
00:30	Nanogam/ Kiovig/Privigen	0,2 – 0,8 g/kg		100	50	
00:30				200	100	
				300		b.

Infuus 3, Schema 3

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						bloedafname, zie order in EPIC
						a. RR, pols, temp
00:30	Nanogam/ Kiovig/Privigen	0,2 – 0,8 g/kg		300	150	
				500		b.

Definitief schema

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						bloedafname, zie order in EPIC
	Nanogam/ Kiovig/Privigen	0,2 – 0,8 g/kg				b.

a. Controles alleen tijdens opbouwperiode.

b. Van elke gift in de opbouw fase een notie maken hoe inloop is gegaan en of er thuis klachten zijn geweest.

Mail Greetje van Zuiden met het verzoek deze eind pompstand te vermelden in het therapieplan.

Werkwijze opbouw schema Immunglobulines (Nanogam, Kiovig, Privigen)

Bij infusiereacties:

- Bij mogelijk **lichte** overgevoeligheidsreacties (dus zonder tensie-daling, grote polsverandering, huidreactie of heesheid/stridor) mag zonder overleg met V.S./arts als volgt gehandeld worden:
 - Zet de lijn met immunoglobuline STOP.
 - Sluit extra infuussysteem met NaCl 0,9% aan en zet de lijn open.
 - Doe controles: RR, Pols en Temperatuur.
 - Observeer de klachten gedurende 30 minuten.
 - Indien na enige tijd de klachten verdwijnen of verminderen mag de toediening hervat worden op de laatste infusiesnelheid die de patiënt verdroeg.
Na wederom 30 minuten nogmaals proberen op te hogen
- Indien de klachten niet verdwijnen of verminderen:
 - Vraag verpleegkundig specialist of arts in consult.
- Indien anafylactische reactie: handel volgens protocol anafylactische reactie..

Als de patient thuis klachten heeft gekregen na toediening van de immunglobuline, overleg met verpleegkundig specialist. ip kun je starten met de stand voorafgaande aan de eindstand van de vorige keer.

Bv: patient komt voor de derde gift en heeft thuis klachten ervaren, dan start je met schema twee, pompstand 200 /TIV 100.

Het doel is om bij voorkeur 1 inloopsnelheid zonder opbouw stappen.

Voor meer informatie zie [DocPortal](#).

Informatie benadrukt door de verpleegkundige van het Dagcentrum:

- Adviezen voor thuis:
 - Bij overgevoeligheidsreacties: bel de huisarts/doktersdienst of 112.
 - Breng uw hoofdbehandelaar op de hoogte van de reactie door een telefonische afspraak te laten maken via de poli. Bij huidreactie: maak hier een foto van.
 - Poli immunologie: 050 3612712
 - Poli neurologie: 050 3613500
 - Poli hematologie: 050 3612370
- Bereikbaarheid artsen neurologie:
Professor Kuks: 77583. Zijn mobiele nummer staat op de telefoonlijst.
Indien niet bereikbaar: consultendienst neurologie 77579
(emailadres zonder '(med)')
- Verpleegkundig specialisten Reumatologie/Immunologie: G. v Zuiden tel: 46002 of B. Hollander tel: 10667