

Longoncologie behandeling NSCLC Pemetrexed monotherapie

Bij NSCLC, 4 kuren à 3 weken of maintenance tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: PEMETREXED: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

NB voorbereiding:

- 1 week vóór dag 1 starten met Foliuzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
		Dexamethason		8 mg		bolus		
	00:10	PEMETREXED (Alimta) in 100 ml NaCl 0,9%	500 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of de patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC Pemetrexed monotherapie

Informatie over de kuur:

- Indicatie: niet-kleincellig longcarcinoom
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over de geneesmiddelen:

- Pemetrexed: Cytostaticum, Foliumzuuranalogen, een 'multi-targeted' antifolaat
 - Om de incidentie en ernst van huidreacties te verminderen krijgt de patiënt een recept voor Dexamethason.
 - Om de toxiciteit te verminderen krijgt de patiënt recepten voor vitaminesupplementen.
 - Pemetrexed (Alimta) bereid in NaCl 0.9%

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - pemetrexed

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Geen NSAID's 2 dagen voor tot en met 2 dagen na de Pemetrexed. NSAID's staken bij kreat klaring < 35 ml/min.
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken