

## Toedienlijst Iloprost Vervolgschema

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Specialisme  | :IALP, IREP     |
| Interval     | :varieert       |
| Totaal       | :varieert       |
| Afspraakcode | :ILOPROST 7 uur |

| Inloop-tijd | Geneesmiddel | Dosering   | Toediening | Pompstand | TIV | Toelichting             |
|-------------|--------------|--|------------|-----------|-----|-------------------------|
|             |              |  |            |           |     | RR, pols                |
| 6 uur       | Iloprost     | <a href="#">0,5 ng/kg/min</a><br>tot *<br><a href="#">2 ng/kg/min.</a> | iv         |           |     | a.<br>spuitenpomp<br>b. |

\*Dosis is de maximaal getolereerde dosis die aan het einde van het startschema is vastgesteld.

### Verpleegkundige instructies:

- a: Los het geneesmiddel op volgens de aanwijzingen op het achtergronddocument.
- b: Spoelen: Na inlopen van de totaal voorgeschreven dosering naspoelen met NaCl 0,9 % op dezelfde snelheid als de Iloprost. De verlengslang hoeft niet gespoeld te worden, alleen het stukje slang van het kraantje naar de patiënt.
- Indien bijwerkingen: zie achtergrondinformatie.
- Als patiënten na toediening van Iloprost vanuit een liggende positie overeind komen, moet rekening gehouden worden met het optreden van orthostatische hypotensie.
- Adviseer de patiënt (indien van toepassing) te stoppen met roken.

## Achtergrondinformatie Iloprost vervolgschema

### Informatie over het protocol:

- Indicatie: Fenomeen van Raynaud, primair of secundair en digitale ulcera. Het doel is vasodilatie en daardoor een betere circulatie.
- Doel startschema dag 1: maximaal getolereerde dosis bepalen.
- Startschema dag 2,3,4,5: maximaal getolereerde dosis.
- **Vervolg: Vervolgschema met maximale getolereerde dosis.**
- Arts dient opdracht in aantal milliliters en inloopsnelheid via uitdraai [computerprogramma](#) te geven. Dit geldt als groene lijst.

### Informatie over het geneesmiddel:

- [Iloprost](#) (Ilomedine): prostaglandine

Voor meer informatie (bijwerkingen) zie DocPortal

### Verpleegkundige toelichting en - instructies:

- a.: Oplossen:
  - Vul een 50 cc spuit met 49,5 ml NaCl 0,9%.
  - Voeg 0,5 ml = 50 microgram Iloprost toe.
  - Vermeng grondig en voorzichtig, cave lekken.
  - De concentratie is dan: 1,0 microgram /ml.
  - Sluit er een verlengslang op aan. (capaciteit is 1,8 ml)
  - Vul de slang en sluit deze aan.
  - Plaats de spuit in de spuitpomp.
  - Zet totaalvolume op 0.
  - Stel de snelheid en het te infunderen volume in volgens de opdracht.
- Indien bijwerkingen:

|  |   |
|--|---|
| Misselijkheid, roodheid, warm krijgen, hoofdpijn | Zo nodig overleg met arts t.a.v. verlagen inloopsnelheid, gebruik analgetica en/of antiemetica. |
| Hoofdpijn  | Zo nodig 1000 mg Paracetamol geven zonder overleg met de arts, wel goed rapporteren.            |
| Tensiedaling                                     | Infuus staken, en arts waarschuwen  |
| Pijn op de borst                                 | Infuus staken, en arts waarschuwen  |
| Hartkloppingen                                   | Infuus staken, en arts waarschuwen  |

- Levering: Standaard assortiment INDC.