

In studieverband :.....

Buiten studieverband

VCD

Therapielijst\aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966B	chemo gemetast	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: multipel myeloom VCD: 4 kuren à 3 weken Bron:	Afspraakcodes DC: VCD: 1,5 uur/ 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Opmerkingen:

Kuurnummer:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP-STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1		ONDANSETRON	iv	8 mg		bolus		
	1		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg		a. in minimaal 5 sec. inspuiten. b. MUST		
	1	00:30	CYCLOFOSFAMIDE 500 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9%	iv	... mg				
	1		DEXAMETHASON	p.o.	40 mg		recept arts		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Nieuwe injecties moeten op een afstand van ten minste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Wissel de injectieplaatsen af en noteer injectieplaats in het zorgdossier. De naald na het inspuiten van de Bortezomib pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- b. Screen op ondervoeding: neem de MUST af.

vervolg recept zie volgende pagina

patiëntensticker

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	4		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg		<i>a.</i> in minimaal 5 sec. inspuiten.		

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	8		ONDANSETRON	iv	8 mg		bolus		
	8		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg		<i>a.</i> in minimaal 5 sec. inspuiten.		
	8	00:30	CYCLOFOSFAMIDE 500 mg/m ² in 100 ml NaCl 0,9%	iv	... mg				
	8		DEXAMETHASON	p.o.	40 mg		recept arts		
							bloedsuiker prikken		

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	11		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg		<i>a.</i> in minimaal 5 sec. inspuiten.		

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	15		DEXAMETHASON	p.o.	40 mg		recept arts		

Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Nieuwe injecties moeten op een afstand van ten minste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Wissel de injectieplaatsen af en noteer injectieplaats in het zorgdossier. De naald na het inspuiten van de Bortezomib pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- Bloedsuiker prikken op dag 8, via vingerprik, arts mailen indien glucose 10-13 mmol/l, en bellen indien bloedsuiker > 13 mmol/l.

Achtergrondinformatie VCD

Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Multipel myeloom
- Indicatie: Eerstelijns behandeling bij multipel myeloom, leeftijd tot 65 of vitaal tussen 65-70 die in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. Deze kuur kan ook later in het beloop van de ziekte gegeven worden.
- Vervolg: autologe stamceltransplantatie

Informatie over het geneesmiddel:

- Bortezomib: antineoplastisch middel, cytotoxisch, proteasoomremmer.
 - De behandeling met Bortezomib is zeer vaak geassocieerd met perifere neuropathie. De incidentie van perifere neuropathie stijgt in het begin van de behandeling en is het hoogst tijdens kuur 5. Aanbevolen wordt om patiënten zorgvuldig te controleren op symptomen van neuropathie, zoals een branderig gevoel, hyperesthesie, hypo-esthesie, paresthesie, veranderd gevoel, neuropathische pijn of zwakte. Patiënten met nieuwe of verergerde perifere neuropathie moeten een neurologisch onderzoek ondergaan en het kan nodig zijn de dosis en het toedieningschema van Bortezomib te wijzigen. Bortezomib subcutaan geeft dezelfde resultaten als de intraveneuze behandeling met Bortezomib maar met beduidend minder neuropathie.
- Cyclofosfamide: Cytostaticum behorende tot de alkylerende middelen.
 - Grapefruit en pompelmoes bevatten een verbinding die de werking van cyclofosfamide kan verminderen.
- Dexamethason: Gefluorideerd corticosteroid met sterk glucocorticoïde eigenschappen.
 - Dexamethason kan onder andere euforie, slapeloosheid en hoge bloedsuikers veroorzaken.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Bortezomib:
Instrueer de patiënt symptomen van neuropathie te melden bij de arts.
- Cyclofosfamide:
Adviseer de patiënt extra te drinken en urine snel uit te plassen.
Instrueer de patiënt geen grapefruit en pompelmoes te eten en geen grapefruitsap en pompelmoessap te drinken.
- Dexamethason:
Adviseer de patiënt om Dexamethason 's morgens in te nemen.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- S.D.D.(Ciproxin, Diflucan)
- Valaciclovir (Zelitrex®): 2x 500 mg per dag