

## Protocol assisteren: Inbrengen C.V.C, Jugularis of Femoralis

- \* Catheter wordt gebracht door nefroloog of nefroloog i.o.

### Doel

- \* Het verschaffen van een permanente intraveneuze toegang voor behandeling (Hemodialyse of plasmaferese)

### Benodigde middelen en materialen (Alfabetische volgorde)

2x	Bakje steriel	-	Op steriel veld
1x	C.V.C. (lengte 15, 20 of 24 cm, vragen aan arts welke)	-	Op steriel veld
	Chloorhexidine	-	In bakje schenken
	Duralock 46.7%	-	Op steriel veld
	Echo apparaat		
5x	Gaaskompressen, 10 cm x 10 cm	-	Op steriel veld
1x	Handschoenen steriel (Maat vragen aan arts)	-	Klaarleggen op aanrecht
	Hechtdraad	-	Op steriel veld
	Intraoperative probe cover	-	Op steriel veld
	Lidocaïne 2% (ampul à 10 ml)	-	Aangeven aan arts
1x	Mesje, steriel blauw (Disposable)	-	Op steriel veld
1x	Mondkapje	-	Klaarleggen op aanrecht
	Naaldvoerder (Mayo-hegar)	-	Op steriel veld
3x	NaCl 0,9% (ampul à 30 ml)	-	In steriele bakje schenken
1x	Ok doek, groot	-	Steriel veld van maken
4x	Ok doeken	-	Op steriel veld
1x	Ok jas	-	Aangeven aan arts
1x	Ok muts	-	Klaarleggen op aanrecht
2x	Opzuignaalden (rood 18G x 1 1/2")	-	Op steriel veld
	Pincet	-	Op steriel veld
	Pleister		
5x	Spuiten, 10cc	-	Op steriel veld
1x	Verdovingsnaald (Geel 20G x 2 3/4")	-	Op steriel veld

### Vorbereiding

- \* Verzamel alle benodigdheden
- \* Informeer de patiënt
  - Vertel dat stil en ontspannen liggen belangrijk is.
  - Als de patiënt pijn of benauwdheid ervaart, informeren dit aan te geven.

## Werkwijze

- \* Plaats de patiënt in de goede houding
- \* Breng het bed in Trendelenburg (Femoralis niet)
- \* Echo maken voor zoeken juiste plaats aanprikken
- \* Arts wast handen volgens handenwas protocol
- \* Arts doet Ok jas en handschoenen aan
- \* Assistent maakt door middel van ok doek een steriel veld
- \* Arts legt de steriele doeken op lichaam patiënt
- \* Desinfecteert de plaats van aanprikken met chloorhexidine
- \* Legt alle materialen klaar en zuigt de vloeistoffen op - materiaal (Zie boven)
- \* Pakt echokop steriel in
- \* Observeert en informeert tijdens het inbrengen de patiënt
- \* Zoekt de juiste plek en geeft de patiënt een plaatselijke verdoving (onder echo geleiding)
- \* Prikt het vat aan en brengt de voerdraad naar binnen (onder echo geleiding)
- \* Met een kleine incisie en dilatator wordt de insteek iets groter
- \* De catheter wordt over de voerdraad naar binnen geschoven
- \* Voerdraad wordt eruit getrokken
- \* Catheter wordt gecontroleerd door opzuigen van bloed
- \* Catheter wordt doorgespoeld
- \* Catheter wordt geflushed met Duralock 46.7%
- \* Met 2 hechtingen wordt de catheter vastgemaakt
- \* Wond wordt afgeplakt met gaasje en wondfolie
- \* Indien mogelijk verwijderen overtollig chloorhexidine
- \* Indien nodig extra materiaal aangeven

## Nazorg

- \* Verwijder ok doeken van patiënt
- \* Informeer hoe de patiënt zich voelt - Bij klachten arts raadplegen
- \* Verwijder overtollig chloorhexidine met washandje en water
- \* Help de patiënt omhoog te zitten
- \* Help de patiënt evt. met het aantrekken van kleding
- \* Bel de afdeling op zodat patiënt opgehaald wordt - Afdeling regelt X-thorax
- \* Ruim behandelkamer op
- \* Maak behandeltafel schoon met alcohol
- \* Folder meegeven aan patiënt

## Administratie

- \* Patiënt in en uitchecken in Epic

## Aandachtspunten

- \* Als patiënt benauwd wordt of andere klachten heeft, altijd arts raadplegen