

Longoncologie behandeling NSCLC compassionate use Nintedanib-Docetaxel

2^e lijn bij stadium IIIb/IV adenocarcinoom, 4 kuren à 3 weken, hierna Nintedanib maintenance

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: DOCEMETA: 2 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		Dexamethason		8 mg		bolus		
	00:30	inwerken pre-medicatie						
	01:00	DOCETAXEL in 250 ml NaCl 0,9%	75 mg/m ²	mg				
		NINTEDANIB	2dd 200 mg per os			recept arts		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of de patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- Observeer tijdens toediening Docetaxel op overgevoeligheidsreacties.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC compassionate use Nintedanib-Docetaxel

Informatie over de behandeling:

- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, 2^e lijn bij stadium IIIb/IV adenocarcinoom. Compassionate use voor patiënten met een FGFR1 mutatie.
- Evaluatie: na 2 en 4 kuren
- Vervolg: Nintedanib monotherapie maintenance tot progressie of tot dat er geen klinisch voordeel meer is.

Informatie over de geneesmiddelen:

- Docetaxel: Antimitotisch cytostaticum behorende tot de taxanen.
- Nintedanib (BIBF1120): een tyrosine-kinase inhibitor

Mogelijke bijwerkingen:

- misselijkheid
- overgeven
- diarree
- buikpijn
- afwijkende leverwaarden in het bloed
- vermoeidheid
- gewichtsverlies

Voor meer informatie over Docetaxel zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: longoncologie-voorlichting-nintedanib/docetaxel

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Geef de patiënt advies over gebruik van nagelbescherming. Om nagel afwijkingen of verlies te voorkomen kan er een nagelverharder geadviseerd worden om te gebruiken. Men dient deze zelf te kopen bij de drogist. Nagelverharder voor **gevoelige** nagels. Bijvoorbeeld Soft van Herôme. Dit is zonder formalhyde en geeft geen pijn. Gebruiken vanaf het aller eerste begin, zo mogelijk de avond voor de kuur behandeling. Ook de voetnagels. Ook mannen adviseren.
- Instrueer de patiënt neuropathische klachten te melden aan de behandelend arts.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax