

Longoncologie behandeling NSCLC Gemcitabine als radiosensitizer

1e lijns behandeling bij stadium III NSCLC, 5 weken radiotherapie met gemcitabine als radiosensitizer
(meestal voorafgegaan door 2 inductiekuren met Cisplatin/Gemcitabine of Cisplatin/Pemetrexed)

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: niet gemetast: GEMCI: 1 uur gemetastaseerd: GEMCIMETA: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
	Arts kruist aan: <input type="checkbox"/> niet gem <input type="checkbox"/> gemetast	339966A 339966B	
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	300 mg/m ²	mg		.		

	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	300 mg/m ²	mg				

	15		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	300 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Vervolg van de kuur op de volgende pagina!

patiëntensticker

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	22		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	300 mg/m ²	mg				

	29		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	300 mg/m ²	mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

patiëntensticker

Achtergrondinformatie NSCLC Gemcitabine als radiosensitizer

Informatie over de behandeling:

- Indicatie: niet kleincellig longcarcinoom, 1e lijns behandeling bij stadium III, 5 weken radiotherapie met gemcitabine als radiosensitizer.
- meestal voorafgegaan door 2 inductiekuren met Cisplatin/Gemcitabine of Cisplatin/Pemetrexed.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
 - Gemcitabine heeft radiosensibiliserende activiteit.
- Cisplatin: Cytostaticum behorende tot de platina verbindingen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatin/gemcitabine
- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatin/pemetrexed
- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – gemcitabine als radiosensitizer: volgt

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.
- Informeer de patiënt dat er minimaal 1,5 uur tussen het Gemcitabine-infuus en de radiotherapie moet zitten.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax