

Longoncologie behandeling NSCLC studies CA209-026 Nivolumab 12NAT01807

Pemetrexed maintenance

1e lijns bij stadium IV of recidief NSCLC PD-L1 positief, maintenance behandeling à 3 weken na 4 kuren cis/carbo – pemetrexed

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: PEMETREXED 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

NB:
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
		Dexamethason		10 mg		bolus		
	00:10	PEMETREXED in 100 ml NaCl 0,9% let op: studieaanvraag nodig	500 mg/m ²	mg		a.		

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Check of patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- a. noteer start- en stoptijd op **controlelijst**.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC studies CA209-026 Nivolumab: Pemetrexed maintenance

Informatie over de studie:

- Studie: CheckMate 026: Een open-label, gerandomiseerde, fase III studie met Nivolumab versus chemotherapie. Cross-over is mogelijk.
- Middelen:
Arm A: Nivolumab (BMS-936558)
versus
Arm B:
Squamous: Carboplatin/Gemcitabine of Carboplatin /Paclitaxel of Cisplatin/Gemcitabine
Non squamous: Carboplatin/Pemetrexed of Cisplatin/Pemetrexed
- Indicatie: eerstelijns behandeling bij stadium IV of recidief, PD-L1 positieve, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Informatie over het geneesmiddel:

- Pemetrexed: Cytostaticum, Foliumzuuranalogen, een 'multi-targeted' antifolaat
 - Om de incidentie en ernst van huidreacties te verminderen krijgt de patiënt een recept voor Dexamethason.
 - Om de toxiciteit te verminderen krijgt de patiënt recepten voor vitaminesupplementen

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax
- Geen NSAID's 2 dagen voor tot en met 2 dagen na de Pemetrexed.
NSAID's staken bij kreat klaring < 35 ml/min.
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken

Contact:

- Onderzoeksarts: dr. J. Hiltermann
- Coördinerend researchverpleegkundige: Thea Scholtens
- Datamanager: Marjan Dubbelman

Controlelijst: CA209-026: PEMETREXED MAINTENANCE

Kuur:.....

Datum.....

Sticker patiëntgegevens

Start- en stoptijden medicatie:

GENEESMIDDEL.....

GENEESMIDDEL.....

START TIJD.....

START TIJD.....

STOP TIJD.....

STOP TIJD.....

Controles:

Tijdstip	RR	Pols	Temp

Bijzonderheden: