

Longoncologie behandeling NSCLC studies CA209-026 Nivolumab 12NAT01807
Cisplatine-Gemcitabine, dag 8 Gemcitabine

1^e lijns bij stadium IV/recidief NSCLC, PD-L1 positief. Vier kuren à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: GEMCIMETA 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	8		Dexamethason		10 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9% let op: studieaanvraag nodig	1250 mg/m ²	mg		a.		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.
- a. Noteer start- en stoptijden op de **controlelijst**.

anti-emetica thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC studies CA209-026 Nivolumab: Cisplatine-Gemcitabine, dag 8 Gemcitabine

Informatie over de studie:

- Studie: CheckMate 026: Een open-label, gerandomiseerde, fase III studie met Nivolumab versus chemotherapie. Cross-over is mogelijk.
- Middelen:
Arm A: Nivolumab (BMS-936558)
versus
Arm B:
Squamous: Carboplatin/Gemcitabine of Carboplatin /Paclitaxel of Cisplatin/Gemcitabine
Non squamous: Carboplatin/Pemetrexed of Cisplatin/Pemetrexed
- Indicatie: eerstelijns behandeling bij stadium IV of recidief, PD-L1 positieve, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
 - Gemcitabine heeft radiosensibiliserende activiteit.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Gemcitabine
 - Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax

Contact:

- Onderzoeksarts: dr. J. Hiltermann
- Coördinerend researchverpleegkundige: Thea Scholtens
- Datamanager: Marjan Dubbelman

Controlelijst: CA209-026: CISPLATINE/GEMCITABINE; DAG 8: GEMCITABINE

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start- en stoptijden medicatie:

GENEESMIDDEL.....

GENEESMIDDEL.....

START TIJD.....

START TIJD.....

STOP TIJD.....

STOP TIJD.....

Controles:

Tijdstip	RR	Pols	Temp

Bijzonderheden: