

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---|
| Patiëntsticker: | Datum aanvraag | Afdelingscode | Afspraakcode dagcentrum: CARBOPEME 1,5 uur |
| | Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% | | |
| | Kreatinineklaring | ml/min | |
| | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Lich.opp (m ²) |
| | Toedieningswijze | IV, tenzij anders vermeld | |
| | | 339966B | chemo gemetastaseerd |
| | Naam + paraaf arts | | |
| | Gefaxt/gescand | Paraaf: | |

NB voorbereiding:
- 1 week vóór dag 1 starten met Foliuimzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken

| datum | Inlooptijd (hr:min) | geneesmiddel | dosering | dosis | pompstand | toelichting | Par.1 | Par.2 |
|-------|---------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-------------|-------|-------|
| | | Dexamethason | | 10 mg | | bolus | | |
| | | Granisetron | | 1 mg | | bolus | | |
| | 00:10 | PEMETREXED in 100 ml NaCl 0,9% let op: studieaanvraag nodig | 500 mg/m ² | mg | | | | |
| | 00:30 | CARBOPLATINE in 100 ml gluc 5 % let op: studieaanvraag nodig | AUC 6 | mg | | in folie | | |

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of de patiënt de avond van te voren 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- Noteer start- en stoptijden op de **controlelijst**.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Achtergrondinformatie NSCLC studies CA209-026 Nivolumab: Carboplatine-Pemetrexed

Informatie over de studie:

- Studie: CheckMate 026: Een open-label, gerandomiseerde, fase III studie met Nivolumab versus chemotherapie. Cross-over is mogelijk.
- Middelen:
Arm A: Nivolumab (BMS-936558)
versus
Arm B:
Squamous: Carboplatin/Gemcitabine of Carboplatin /Paclitaxel of Cisplatin/Gemcitabine
Non squamous: Carboplatin/Pemetrexed of Cisplatin/Pemetrexed
- Indicatie: eerstelijns behandeling bij stadium IV of recidief, PD-L1 positieve, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Informatie over het geneesmiddel:

- Pemetrexed: Cytostaticum, Foliumzuuranalogen, een 'multi-targeted' antifolaat
 - Om de incidentie en ernst van huidreacties te verminderen krijgt de patiënt een recept voor Dexamethason.
 - Om de toxiciteit te verminderen krijgt de patiënt recepten voor vitaminesupplementen
- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
 - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
 - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax
- Geen NSAID's 2 dagen voor tot en met 2 dagen na de Pemetrexed.
NSAID's staken bij kreat klaring < 35 ml/min.
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B₁₂ 1000 µg 1x/6 weken

Contact:

- Onderzoeksarts: dr. J. Hiltermann
- Coördinerend researchverpleegkundige: Thea Scholtens
- Datamanager: Marjan Dubbelman

Controlelijst: CA209-026: CARBOPLATINE/PEMETREXED

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start- en stoptijden medicatie:

GENEESMIDDEL.....

GENEESMIDDEL.....

START TIJD.....

START TIJD.....

STOP TIJD.....

STOP TIJD.....

Controles:

| Tijdstip | RR | Pols | Temp |
|----------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bijzonderheden: