

Carboplatine-Paclitaxel

1^e lijns bij stadium IV/recidief NSCLC, PD-L1 positief. Vier kuren à 3 weken.

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CARBOPACLI 5 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetastaseerd
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

NB: voor verpleegafdeling bij paclitaxel-toediening:

- P/RR controle à 15 minuten tijdens het 1^e uur van toediening. Patiënt observeren op allergische reacties

- Standby medicatie: 1 mg Adrenaline, 25 mg Prednisolon, 2 mg Tavegil

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		Granisetron		1 mg		bolus		
		Clemastine		2 mg		bolus		
		Dexamethason		10 mg		bolus		
		Ranitidine		50 mg		bolus		
	00:30	inwerken pré-medicatie						
	03:00	PACLITAXEL in 250 ml NaCl 0,9% let op: studieaanvraag nodig	200 mg/m ²	mg		filter 0,2 µm in folie		
	00:30	CARBOPLATINE in 100 ml gluc 5 % let op: studieaanvraag nodig	AUC 6	mg		in folie		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- Observeer tijdens toediening Paclitaxel op overgevoeligheidsreacties.
- Noteer start- en stoptijden op de **controlelijst**.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o. (= kuurdag)
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Achtergrondinformatie NSCLC studies CA209-026 Nivolumab: Carboplatine-Paclitaxel

Informatie over de studie:

- Studie: CheckMate 026: Een open-label, gerandomiseerde, fase III studie met Nivolumab versus chemotherapie. Cross-over is mogelijk.
- Middelen:
Arm A: Nivolumab (BMS-936558)
versus
Arm B:
Squamous: Carboplatin/Gemcitabine of Carboplatin /Paclitaxel of Cisplatin/Gemcitabine
Non squamous: Carboplatin/Pemetrexed of Cisplatin/Pemetrexed
- Indicatie: eerstelijns behandeling bij stadium IV of recidief, PD-L1 positieve, niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Informatie over de geneesmiddelen:

- Paclitaxel: Cytostaticum behorende tot de taxanen.
 - Allergische reacties worden waarschijnlijk veroorzaakt door Cremophor EL[®] (oplosmiddel) in de formulering.
- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen.
 - Dosering vaak op geleide van 'target' AUC met behulp van de Calvert formule. Dit ter vaststelling van de optimale dosering die tevens corrigeert voor variaties in de nierfunctie.
 - Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax

Contact:

- Onderzoeksarts: dr. J. Hiltermann
- Coördinerend researchverpleegkundige: Thea Scholtens
- Datamanager: Marjan Dubbelman

Controlelijst: CA209-026: CARBOPLATINE/PACLITAXEL

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start- en stoptijden medicatie:

GENEESMIDDEL.....

GENEESMIDDEL.....

START TIJD.....

START TIJD.....

STOP TIJD.....

STOP TIJD.....

Controles:

Tijdstip	RR	Pols	Temp

Bijzonderheden: