

Toedienlijst Methylprednisolon

Specialisme	: verschillende
Cyclusduur	: varieert
Totaal	: varieert
Bruto behandeltime	: 01:00.

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand	TIV	Toelichting
00:30	Methylprednisolon	250 – 1000 mg	iv			RR, pols, temp <i>a.</i>
	NaCl 0,9%	100 ml				RR <i>b.</i>

Verpleegkundige toedien-instructies:

- *a.*: Los het geneesmiddel op volgens de aanwijzingen in DocPortal.
- *b.*: Licht arts in bij ongewoon oplopen van de tensie door het infuus.

Achtergrondinformatie Methylprednisolon

Informatie over de behandeling:

- Indicatie:
 - Wanneer snel hoge bloedspiegels van methylprednisolon vereist zijn. Het is geschikt wanneer na enkele uren een systemisch anti-inflammatoir, een anti-allergisch of een immuno-suppressief effect noodzakelijk is.Methylprednisolon is tevens geschikt als algemene therapie wanneer orale glucocorticosteroidtherapie niet voldoende resultaten geeft, parenterale glucocorticosteroidtherapie noodzakelijk blijkt of verkozen wordt boven orale toediening.
- Multiple Sclerose (M.S.)

Informatie over de geneesmiddelen:

- [Methylprednisolon \(Solu-Medrol\)](#): Corticosteroïd met sterk glucocorticoïde eigenschappen.
- Glucocorticosteroïden kunnen bepaalde symptomen van een infectie maskeren en tijdens hun toepassing kunnen nieuwe infecties ontstaan. Onder de invloed van glucocorticosteroïden kan de weerstand verminderen en kan lokalisatie van een infectie moeilijk blijken.

Bijwerkingen:

- zie DocPortal

Verpleegkundige toelichting en - instructies:

- Levering: Apotheek Distributie. standaard assortiment INDC.
- Bereikbaarheid artsen neurologie:
Dr Heersema: 55146. Indien niet bereikbaar, consultendienst neurologie 77579. Of verpleegkundig consulent MS Mw. Coby Bolwijn: 77599.