

Toedienlijst DDAVP (Minrin®) voorafgaand aan een ingreep

Specialisme	: ISTP
Interval	: eenmalig
Afspraakcode	: DDAVP 1 uur

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						RR, pols
00:30	DDAVP	0,3 µg/kg	iv			a.
	NaCl 0,9%	100 ml				

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Tijdens gift kan voorbijgaande tensiedaling en gezichtsblozen optreden.
- a. de hoeveelheid mag afgerond worden op hele ampullen.

Achtergrondinformatie DDAVP (Minrin®) voorafgaand aan een ingreep

Informatie over de behandeling:

- Indicatie: DDAVP injectievloeistof kan worden toegepast voorafgaand aan kleinere chirurgische ingrepen bij patiënten met lichte vormen van hemofilie A, de ziekte van Von Willebrand type I, uraemie of sommige plaatjesdefecten.

Informatie over het geneesmiddel:

- [DDAVP](#) (Desmopressine, Minrin®): een synthetische vorm van het natuurlijke menselijke hypofyse achterkwabhormoon arginine-vasopressine.
 - Het heeft een antidiuretische werking
 - DDAVP is in staat de factor VIII spiegels in het plasma met gemiddeld een factor 3 te doen stijgen. Na een enkelvoudig intraveneus infuus van 0,3 µg per kg lichaamsgewicht houdt dit effect ca. 12 uur aan.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Voorlichting door de verpleegkundige van het Dagcentrum:

- Hyponatriemie (als gevolg van anti-diuretische werking) kan voorkomen, adviseer de patiënt om na toediening DDAVP **niet** overmatig veel te drinken.

Levering: Standaardassortiment INDC (koelkast)