

## Toedienlijst DDAVP (Minrin®) Proefbehandeling

Specialisme	: ISTP
Interval	: eenmalig
Afspraakcode	: DDAVPPROEF 2 uur. Uiterlijk om 11:30 uur inplannen.

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						RR, pols
						a. bloedafname
00:30	<b>DDAVP</b>	0,3 µg/kg	iv			b.
	NaCl 0,9%	100 ml				
						c. venapunctie 1 uur na inlopen
						d. orderbrief meegeven

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Tijdens gift kan voorbijgaande tensiedaling en gezichtsblozen optreden
- a.: betreft factor VIII, vWF-activiteit, vWF-antigeenbepaling (6 ml, citraatbuis blauwe dop) en trombocytenbepaling (4 ml, roze buis). Deze buizen mogen uit het infuus worden afgenomen, maar wel **direct** na het inbrengen van het infuus, want door de prik wordt de stolling geactiveerd en dit kan de bepaling (nulmeting) beïnvloeden.
- b.: de hoeveelheid mag afgerond worden op hele ampullen.
- c.: betreft nogmaals voornoemde bepalingen.
- d.: Geef orderbrief mee voor venapunctie op het priklab, 4 uur na inlopen DDAVP. Het betreft nogmaals voornoemde bepalingen. Noteer het tijdstip van afname op de orderbrief en adviseer de patiënt om een kwartier van te voren een nummertje te trekken bij het priklab.

## Achtergrondinformatie DDAVP (Minrin®) Proefbehandeling

### Informatie over de behandeling:

- Indicatie: Het effect van DDAVP op bloedstolling kan individueel sterk verschillen. Bij hemofilie A patiënten, patiënten met de ziekte van Von Willebrand, patiënten met uraemie, plaatjesdefecten of een geïsoleerde verlengde bloedingstijd wordt derhalve aangeraden voor de chirurgische ingreep een proefdosis te geven om het effect op factor VIII en/of bloedingstijd na te gaan.

### Informatie over het geneesmiddel:

- [DDAVP](#) (Desmopressine, Minrin®): een synthetische vorm van het natuurlijke menselijke hypofyse achterkwabhornormoon arginine-vasopressine.
  - Het heeft een antidiuretische werking
  - DDAVP is in staat de factor VIII spiegels in het plasma met gemiddeld een factor 3 te doen stijgen. Na een enkelvoudig intraveneus infuus van 0,3 µg per kg lichaamsgewicht houdt dit effect ca. 12 uur aan.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Voorlichting door de verpleegkundige van het Dagcentrum:

- Hyponatriemie (als gevolg van anti-diuretische werking) kan voorkomen, adviseer de patiënt om na toediening DDAVP **niet** overmatig veel te drinken.

**Levering:** Standaardassortiment INDC (koelkast)