

Toedienlijst Ibandroninezuur (Bonviva)

Specialisme: IENP/IYYP

Inloop-tijd	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand	TIV	Toelichting
15 – 30 sec	Ibandroninezuur	3 mg	iv			bolus via kraantje
	NaCl 0,9%	50 ml	iv	300		

Verpleegkundige instructies:

-

Achtergrondinformatie Ibandroninezuur

Informatie over de kuur:

- Indicatie: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd risico op fracturen.
- Interval: à 3 maanden
- Totaal aantal kuren: onbekend
- Verblijfsduur: 1 uur

Informatie over de geneesmiddelen:

- Ibandroninezuur
 - Synoniem: Bonviva
 - Eigenschappen: Bisfosfonaten
 - Protocollaire standaard dosis: 3 mg

Bijwerkingen:

Maaq-darmstelsel:

Gastritis, diarree, buikpijn, dyspepsie, misselijkheid, obstipatie

Skelet-spiersstelsel:

Skeletmusculatuur betreffende pijn, artralgie, myalgie,

Algemene aandoeningen:

Griepachtige symptomen, vermoeidheid

Zenuwstelsel aandoeningen:

Hoofdpijn

Huidaandoeningen:

Rash

Verpleegkundige toelichting en - instructies:

- Patiënten kunnen op voorschrift arts aanvullend calcium en vitamine D krijgen.
- Extravasatie kan weefselbeschadiging veroorzaken.
- Levering: Apotheek Distributie, bestellen. Wordt geleverd als een voorgevulde spuit met 3 ml oplossing.