

Toedienlijst Pamidronaat bij multipel myeloom

Specialisme	: IHMP
Indicatie	: Multipel myeloom
Afspraakcode	: APDIHMP 02:00 uur

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand	TIV	Toelichting
01:20	Pamidronaat	30 mg	iv			a.
b.	NaCl 09%	250 ml				

Verpleegkundige toedien-instructies:

- a.: Prik het infuus niet in een kleine vene.
- b. Bij patiënten met een tumorgeïnduceerde hypercalciëmie of multipel myeloom dient de infusiesnelheid niet hoger dan 22,5 mg/uur te zijn.
Bij patiënten met nierinsufficiëntie (creatinineklaring 30-60 ml/minuut) dient de toediensnelheid niet hoger dan 20-22 mg/uur te zijn.
- Bij andere indicaties dan multipel myeloom: bereiding en toediening volgens toedienlijst Pamidronaat IAOP of monografie DocPortal (Pamidroninezuur).

Achtergrondinformatie Pamidronaat bij multipel myeloom

Informatie over het protocol:

- Bij tumorgeïnduceerde hypercalciemie wordt aanbevolen om patiënten voorafgaand aan en tijdens de behandeling te rehydrateren met NaCl 0,9%. Deze patiënten worden doorgaans opgenomen.

Informatie over het geneesmiddel:

- [APD, pamidroninezuur](#): calciumregulerend middel, bisfosfonaat

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Adviseer de patiënt niet deel te nemen aan het verkeer en geen machines te gebruiken indien de patiënt slaperigheid en/of duizeligheid heeft geconstateerd na toediening.