

TOEDIENINGSSCHEMA DAGCENTRUM INTERNE GENEESKUNDE

| | |
|---------------|---|
| Specialisme | : INTP |
| Kuur | : Rituximab(Mabthera) ter voorbereiding op ABO incompatibele niertx |
| Frequentie | : eenmalig |
| Totaal | : 1 |
| Verblijfsduur | : 4 ½ uur |

| dag | omschrijving | dosering | inlooptijd | | | opmerkingen |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----|--------|----------------|
| | | | ml/uur | TIV | min | |
| gift 1 dag 1 | <i>Prednisolon</i> | 25 mg i.v. | <i>bolus</i> | | | |
| | <i>Tavegil</i> | 2 mg i.v. | <i>bolus</i> | | | |
| | <i>Paracetamol</i> | 1000 mg p.o. | | | | |
| | Rituximab | 375 mg/m ² i.v. | ml/uur | TIV | min | 2 mg/ml |
| | | | 33 | 50 | 90 min | |
| | | | 50 | 50 | 60 min | |
| | | | 100 | 50 | 30 min | |
| | | | | | 60 min | rest |

Bijzonderheden:

- **Controles: RR, pols en temp vooraf, eerste 60 min à 15 min, daarna à 60 min en op indicatie**
- Indien patiënt niet vooraf door een arts is gezien: loop de 'checklist Rituximab' na. Indien de patiënt één of meer vragen met 'ja' beantwoordt, de verwijzend arts raadplegen alvorens te starten
- **Rituximab** is een monoklonale antistof, gericht tegen het CD-20 antigeen; aanwezig op vrijwel alle B-cellen. De concentratie is **2 mg/ml**
Bijwerkingen/complicaties: hypotensie, koorts, rillingen, serumziekte. **Allergische reactie; volg protocol 'allergische reactie INDC'**
- Indicatie: voorbereiding niertransplantatie met donornier met incompatibele bloedgroep.
- Tijdens behandeling komt dr. de Maar langs. Patiënt krijgt dan recept mee voor immuunsuppressiva.
- Contactpersonen: A. Roelofs *77532, E.F. de Maar 06 53999008

339957B perifeer
339957D CVC

DV
DV