

In studieverband :.....   
 Buiten studieverband

**CA209-205 NIVOLUMAB**

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1853	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2	339966F	immunotherapie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: Hodgkin Cyclusduur: 2 weken Totaal: tot progressie Bron:	Afspraakcodes DC: CA209-205*: 2 uur <b>Registratieformulier: vul bij 'optie 1' in: O113, dus geen IHMP!</b>	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

\*Let op: er zijn nog andere afspraakcodes met CA209, hier is -205 onderscheidend!

**Opmerkingen:**

**Kuurnummer:** .....

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1							a.controles		
	1	01:00	<b>NIVOLUMAB</b> (BMS-936558) 3 mg/kg in 100 ml NaCl 0,9% <i>let op: studieaanvraag nodig</i>	iv	... mg			b. filter 0,2 µm		

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- a. RR, pols, temp, saturatie in rust en saturatie na inspanning\*. Noteer op **controlelijst**.
- b. Noteer start en stop-tijd op **controlelijst**.
- Observeer op infusiereacties.

## Achtergrondinformatie CA209205 Nivolumab

### Informatie over de studie:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Hodgkin lymfoom
- Studie: een niet-vergelijkende, twee-cohort, enkel armige, open-label, fase II 2 studie van Nivolumab (BMS-936558) bij patiënten met klassiek Hodgkin Lymfoom na falen van een autologe stamceltransplantatie. Het klinische voordeel wordt onderzocht van een behandeling met Nivolumab.  
(CheckMate 205: CHECKpoint pathway and nivolumab clinical Trial Evaluation 205)
- Indicatie: Hodgkin lymfoom
- Evaluatie: CT of MRI en FDG-PET
- Patiënten zullen worden gevraagd kwaliteit-van-leven-vragenlijsten in te vullen.
- Vervolg:

### Informatie over het geneesmiddel:

- Nivolumab (BMS-936558): humaan monokonaal antilichaam PD- L1. Blokkeert de PD-1 pathway.  
Bijwerkingen:
  - Infusiereacties:
    - koorts, koude rilling
    - hoofdpijn
    - huiduitslag
    - jeuk
    - gewrichtspijn
    - bronchospasmen
    - hyper- of hypotensie
  - Misselijkheid
  - Diarree
  - Benauwdheid
  - Vermoeidheid
  - Huiduitslag
  - Verminderde eetlust
  - Pneumonitis
  - Buikpijn

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

### Overig

- Studiearts: dr. G.W. van Imhoff
- Researchverpleegkundige: Henriette Klooster
- Datamanager: Machteld van der Weg

patiëntensticker

**Controlelijst** CA209205 Nivolumab

Kuur:.....

Datum.....

**Sticker patiëntgegevens**

**Starttijd Nivolumab:**

**Stoptijd Nivolumab:**

**Controles:**

Tijdstip (vul in):	RR	Pols	Temp	Saturatie in rust (in bed)	Saturatie tijdens inspanning *	Bloedafname	Paraaf

\*Inspanning: opstaan en een rondje om het bed lopen is voldoende. Of meten direct bij binnenkomst Dagcentrum.

**Bijzonderheden:**