

## **MMTT ( Mixed Meal tolerantie test) bij het dumpingsyndroom**

### **Doel van de test:**

Na een operatieve verkleining van de maag kunnen er zogenaamde dumpingklachten optreden, doordat het voedsel sneller in de darmen terechtkomt.

Dit kan gepaard gaan met klachten zoals een versnelde hartslag, bloeddruk daling en een snelle daling van de bloedsuikerspiegel. Door dit onderzoek wil men vaststellen of er sprake is van één van beide klachten of van beide klachten.

### **Uitvoering van de test:**

- U mag vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken.
- U kunt aan uw arts vragen, of u op de ochtend van de test uw medicijnen mag innemen.
- Het is aan te raden om een schoon shirt of truitje mee te nemen, zodat u zich na afloop van de test even kan opfrissen en verkleiden.
- 's Ochtends wordt u op het dagcentrum verwacht, waar de test plaatsvindt.
- U krijgt een infuus, waarna een half uur wordt gewacht om u tot rust te laten komen.
- Tijdens de test ligt u in een bed.
- Er wordt bloed bij u afgenomen via het infuus om de uitgangssituatie vast te leggen.
- Na 15 minuten krijgt u Nutridrink te drinken.
- Vervolgens wordt nog een aantal keren met tussenpozen van een half uur bloed afgenomen via het infuus en worden uw bloeddruk en hartslag gemeten.
- Na afloop van de test wordt het infuus verwijderd en krijgt u een maaltijd aangeboden.
- De test duurt ongeveer 4 uur.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw internist (via 050-3614697) of met het Dagcentrum: 050-3613402.